

Covid-19 pacientu plūsmas organizēšana NMC



Pacients ar NMPD tiek atvests vai ierodas pats NMC.



Šķirotājs ārsta palīgs visiem pacientiem uzliek ķirurģisko masku (ja tā jau nav uzlikta NMP etapā) un uzdod šādus jautājumus (ja pacients nekontaktējams, pēc iespējas sazināties ar radniekiem, pavadoņiem u.c.):

Vai pēdējo 10 dienu laikā:

- 1) **esat atgriezies no ceļojuma?**
- 2) Jums ir **bijis kontakts ar personu**, kura ir atgriezusies no ceļojuma?
- 3) esat bijis **kontaktā** ar Covid-19 infekcijas slimnieku

↓ **Nē**

Vai ir respiratori vai citi Covid-19 simptomi?*

↓ **Nē**

Organizēt izmeklēšanu stacionārā noteiktajā kārtībā

↓ **Jā**

Brīdina kolēģus. Izolē pacientu. **Lieto IAL (dzeltenais komplekts)**. Veic **SARS-CoV-2 testu**. Nepieciešama stacionēšana?

↓ **Jā**

Ja līdz analīzes rezultāta saņemšanai jāpārved uz nodaļu, stacionē šim mērķim pārprofilētā nodaļā (pre-/Covid-19 nodaļa), ja tas nav iespējams - atsevišķā palātā. **Izolācijas režīms** (skat. rekomendācijas stacionāriem)

↓ **Nē**

Sniedz rekomendācijas, t.sk., atrasties / novēroties mājās – **pašizolācija**. Turpmākā taktika atkarībā no SARS-CoV-2 testa rezultāta.

↓ **Nē**

Brīdina kolēģus. Izolē pacientu. **Lieto IAL (dzeltenais komplekts, ja RAN zāle – sarkanais)**. Veic **SARS-CoV-2 testu**. Nepieciešama stacionēšana?

↓ **Jā**

↓ **Jā****

Stacionē pre-/Covid-19 nodaļā, ja tas nav iespējams – atsevišķā palātā, **izolācijas režīms**. Ja SARS-CoV-2 tests iestājoties ir negatīvs, izolācija jāturpina kopumā 10 dienas kopš atgriešanās vai pēc kontakta. Personāls, ejot pie pacienta lieto IAL. Ja 10 dienu laikā parādās jauni simptomi*, atkārtoti veic pacienta laboratorisko testēšanu uz COVID-19 (skat. Rekomendācijas stacionāriem).

*Covid-19 simptomi- sāp kakls, ir klepus, t, ožas zudums u.c., diareja, trombotiski notikumi (MI, CI), akūta nieru mazspēja. Par aktuālajiem Covid-19 simptomiem sekot publikācijās, jo tie papildinās.

**Ja pacienta stāvoklis pasliktinās – 1. un 2. līmenis, tad pa tālruni informē RAN.